



BIOESTIMULANTES

Fortacell®



Aplicación foliar

***Complejo de acetato calcico
carbohidratado. Actúa como
agente cementante celular.***

Tecnología — Complejo de acetato calcico carbohidratado

Fortacell contribuye en la formación de la estructura de la protopectina, como agente cementante para mantener las células unidas.

Además contiene boro que es importante en la circulación de azúcares, en forma de complejo "azúcar-borato".

Este tipo de complejo es capaz de atravesar las membranas celulares semipermeables.

El principal objetivo es movilizar las reservas hidrocarbonadas de las hojas hacia los puntos de fructificación.

Calcio+Boro+Aminoácidos

» Objetivo

Complejo de acetato calcico

» Endurecimiento tejidos

Complejo azucar - borato

» Penetración membranas

Dosis y parámetros de trabajo	Cultivos	Aplicación Foliar	Observaciones
	Frutales hueso y pepita	400-500 cc/Hl	3-5 tratamientos a partir de la caída de pétalos y durante la fase de desarrollo de los frutos.
	Cítricos	400-500 cc/Hl	3-5 tratamientos a partir de la caída de pétalos y durante la fase de desarrollo de los frutos.
	Viña Uva de mesa	300-400 cc/Hl	2-3 aplicaciones durante la fase final del ciclo de cultivo. 2-3 aplicaciones durante la fase final del ciclo de cultivo, a partir del cuajado de las primeras flores en hortalizas de flor.
	Hortalizas	300-400 cc/Hl	Aplicado durante todo el ciclo de cultivo ayuda a prevenir el tip-burn en hortalizas de hoja.

Propiedades físicas	Formulación	Color	pH (0,1% solución líquida)	Densidad (g/cm) 20°C	Conductividad E.C. 0,1% (mS/cm) 18°C
	Líquido	Marrón	4	1,31	1,480 mS/cm

Composición p/p	Oxido de potasio (K2O)	Oxido de Calcio (CaO) Complejado	Boro (B) Soluble en agua	Aminoácidos libres	Agente complejante
	10%	5%	0,3%	3%	Acido glucónico