



ASPERBIO®



Aplicación foliar



Aplicación radicular

***Aspergillus niger* $2,5 \times 10^7$ UFC/mL**

Inoculante Biológico

ASPERBIO contiene el hongo beneficioso *Aspergillus niger* EEZ-93 que coloniza la raíz de la planta potenciando el crecimiento y desarrollo del cultivo, así como la

tolerancia a la sequía y la salinidad. ASPERBIO también aumenta la solubilidad de los nutrientes, incluido el fosfato.

ASPERBIO está diseñado para uso únicamente en cultivos agrícolas. Aplicar ASPERBIO mediante sistema de riego, incluidos sistemas de goteo.

Composición garantizada

Aspergillus niger

$2,5 \times 10^7$ UFC/ml

Dosis y parámetros de trabajo

Cultivos	Dosis por aplicación (L/ha)	Época de aplicación
Cebolla, Ajo, Esparrago, Brócoli, Coliflor, Col, Rábano, Berenjena, Tomate de cascara, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Alcachofa, Yuca, Zanahoria, Lechuga, Espinaca, Acelga y Apio	1-2	Durante el desarrollo vegetativo, realizar 3 aplicaciones al suelo vía sistema de riego, a intervalos de 10 días; iniciar después del trasplante o después del establecimiento del cultivo.
Maíz, Sorgo, Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Arroz Frijol, Alubia, Haba, Garbanzo, Lenteja y Soya	1-2	Durante el desarrollo vegetativo, realizar 3 aplicaciones al suelo vía sistema de riego, a intervalos de 10 días; iniciar después del trasplante o entre los 8 a los 10 días después del establecimiento del cultivo.