



EKLOBAC®



Aplicación foliar



Aplicación radicular

Ácido Algínico procedente de extracto líquido de alga Ecklonia Máxima y fermentación microbiana con la bacteria Pseudomona.

Inoculante Biológico

EKLOBAC aumenta la solubilización del fósforo y la disponibilidad de hierro y nitrógeno. Activa la producción de fitohormonas y ácido algínico. Induce la síntesis de sideróforos y activación de enzimas degradadoras de

materia orgánica. Promueve un microbioma equilibrado, favoreciendo un suelo supresivo. Preserva el equilibrio del suelo, contribuyendo a un mejor crecimiento de las plantas en condiciones de estrés.

EKLOBAC es una biosolución líquida especialmente diseñada para cuidar la microbiota del suelo, aumentando la población de microbios. Está formulado a base de ácidos orgánicos y ácido algínico obtenidos mediante fermentación de rizobacterias.

Composición garantizada

0,5 % (p/p) Ácido algínico
0,5 % (p/p) Ácido orgánico.
Fermentación de
Pseudomonas Chlororaphis MB1.

Dosis y parámetros de trabajo

Cultivos	Dosis por aplicación (L/ha)	Época de aplicación
Cebolla, Ajo, Esparrago, Brócoli, Coliflor, Col, Rábano, Berenjena, Tomate de cascara, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Alcachofa, Yuca, Zanahoria, Apio, Lechuga, Espinaca y Acelga	1-2	Durante el desarrollo vegetativo, realizar 3 aplicaciones al suelo via sistema de riego, a intervalos de 20 días; iniciar después del trasplante o después del establecimiento del cultivo.
Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Manzano, Peral, Tejocote, Membrillo, Banana, Café, Tabaco y Agave	2-3	Durante el desarrollo vegetativo, realizar 3 aplicaciones al suelo via sistema de riego, a intervalos de 10 días; en cultivos ya establecidos, iniciar en brotación; y en cultivos en fase inicial, comenzar después del trasplante.
Maiz, Sorgo, Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Arroz, Frijol, Alubia, Haba, Garbanzo, Lenteja y Soya	1-2	Durante el desarrollo vegetativo, realizar 3 aplicaciones al suelo via sistema de riego, a intervalos de 10 días; iniciar después del trasplante o entre los 8 a los 10 días después del establecimiento del cultivo.